

ねつ・のどの痛み・せき・頭痛 [かぜ薬] 第②類医薬品

ロン三室IP錠

《イブプロフェン・生薬・ビタミンC配合》

かぜでは、頭痛、発熱、のどの痛み、せき、鼻水、くしゃみ、関節の痛みなどいろいろな症状があらわれます。ロン三室IP錠は、このようなかぜのさまざまな症状を改善するイブプロフェン、ビタミン、生薬を配合した総合かぜ薬です。熱、のどの痛みをはじめ、かぜの諸症状によく効きます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

* (3) 15才未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含む有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがあります）

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 5日間を超えて服用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。

高熱、むくみ、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病

(9) 次の病気にかかったことのある人。

胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎
精神神経系	めまい
そ の 他	目のかすみ、耳なり、排尿困難、むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
腎障害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれらに伴って息苦しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿・蛋白尿等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）

偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。）
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、下痢、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

1日3回、食後なるべく30分以内に次の量を服用してください。

年齢	大人（15才以上）	15才未満
1回量	4錠	服用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

用法・用量を必ず守ってください。

成分と働き


大人1日量（12錠）中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	働 き
イブプロフェン	450mg	熱を下げ、頭痛、のどの痛みなどを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を抑えます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきの中枢に働いて、せきの発生を抑えます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきをしずめ、たんをきります。
無水カフェイン	75mg	頭痛をしずめ、眠気を防ぎます。
アスコルピン酸（ビタミンC）	300mg	消耗しがちなビタミンを補給します。
チアミン硝化物	24mg	
リボフラビンリン酸エステルナトリウム	12mg	
カンゾウエキス （原生薬換算量2400mg）	800mg	せきをしずめ、たんや痛みを抑える効果があります。
ケイヒ末	400mg	熱を抑え、痛みをしずめる効果があります。
ショウキョウ末	200mg	全身をあたため、発汗させて熱を下げる効果があります。

添加物として、無水ケイ酸、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ステアリン酸Mg、マクロゴール、白糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、アラビアゴム、ゼラチン、炭酸Ca、タルク、カルナウバロウを含んでいます。


【服用時のアドバイス】

- かぜをひいたら、早くかぜ薬を服用して安静にすることが大切です。
- 部屋を暖かくし、時々窓をあけて換気をし、体を冷やさないように衣服にも注意することが必要です。汗をかいたら肌着はこまめに取り替えましょう。
- 栄養に注意し、カロリーが高く消化の良いものをとるようにするとよいでしょう。また水分を充分とり、ビタミン類も補給しましょう。
- コップ一杯のぬるま湯で服用すると効果的です。



保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18