

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

飲みすぎに、スーッと効く緑の胃ぐすり _____ 医薬品
[むかつき][胃痛][胸やけ]

サクロン錠

Saclon
TABLETS

FOR UPSET STOMACH ASSOCIATED WITH PAIN AND HEARTBURN...

特徴

サクロン錠は、飲みすぎなどによる胃の不快症状によく効く緑の胃ぐすりです。
普段は丈夫な胃も、その時々体調やアルコールなどの刺激により胃酸分泌が過多となり、胃自体がキズつけられてしまうことがあります。また、過度の飲酒によりアルコールが胃粘膜を直接刺激し、不快症状の原因となります。

サクロン錠は、出過ぎた胃酸の働きを弱め(中和)、キズついた胃粘膜を葉緑素から作られた緑の成分で修復・保護します。

ムカムカする胸やけやキリキリする痛みなどの胃の不快感に、サクロン錠は「スーッと飲めば、スーッと効く」緑の胃ぐすりです。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬

2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を
さけてください

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)高齢者

(4)本人又は家族がアレルギー体質の人

(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6)次の症状のある人

排尿困難

(7)次の診断を受けた人

腎臓病、心臓病、緑内障

2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は
薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)2週間位服用しても症状がよくならない場合

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は
増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して
ください

口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります

(裏面へつづく)

■ 効能・効果

胃痛、胸やけ、飲みすぎ、胃酸過多、胃もたれ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

■ 用法・用量

次の量を食間および就寝前の空腹時に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	4 錠	3 回
8 歳以上15歳未満	2 錠	
8 歳未満	服用しないこと	

* 食間とは、食後2時間ほど経過し、胃の中に食べた物がほぼなくなっている時です。

■ 小児(8歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分と働き

成人1日量12錠中に次の成分を含みます。

成 分	含 量	働 き
銅クロロフィリンカリウム	120mg	荒れた胃粘膜を修復・保護します。
無水リン酸水素カルシウム	1,020mg	
沈降炭酸カルシウム	1,020mg	出過ぎた胃酸を直接中和します。
水酸化マグネシウム	960mg	
ロートエキス3倍散	90mg	胃酸の分泌を抑え、痛みを止めます。

- (1)添加物として、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、トメントール、香料、塩化K、ケイヒ、ステアリン酸Mg、ポビドン含有します。
- (2)服用後、便が緑色になる場合がありますが、銅クロロフィリンカリウム(緑色)が排泄されるための着色であり、心配はありません。
- (3)サクロン錠には、アルミニウムを含む成分は使用していません。

ひとくちメモ

葉緑素成分には、創傷治癒促進作用などがあります。サクロン錠は、葉緑素から作られた緑の成分を有効成分として配合し、荒れた胃粘膜のキズをしっかり修復・保護します。サクロン錠の鮮やかな緑色は、有効成分の色なのです。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、他の薬剤等を混ぜないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (5)4錠入り分包は、次のことに注意してください。
分包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。
- (6)96錠包装は、次のことに注意してください。



- 1) 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用ですので、容器のキャップを開けた後は捨ててください。また容器は密栓して保管してください。
- 2) 使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6か月以内に使用してください。箱の内ブタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。

■ 包装

サクロン錠 4錠入り分包×10包(携帯用)・96錠

本品についてのお問い合わせ先

●お買い求めのお店

●エーザイ「お客様ホットライン室」(フリーダイヤル ☎0120-161-454)

受付時間 平日 9:00~18:00(土、日、祝日 9:00~17:00)

ホームページ「胃のサイエンス」では胃の健康に関する情報をお届けしています。

<http://www.i-no-science.com>

製造販売元



サンノーバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10