

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

塩酸プソイドエフェドリン配合鼻炎薬

スッフル®鼻炎ロング

塩酸プソイドエフェドリンが鼻づまりの原因となる鼻粘膜の充血やはれをおさえて、鼻づまりに優れた効果を発揮します。

スッフル鼻炎ロングは、5種の成分がバランスよく働いて、アレルギー性鼻炎、急性鼻炎の諸症状を緩和します。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

(2)次の症状がある人

前立腺肥大による排尿困難

(3)次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)高齢者

(4)本人又は家族がアレルギー体質の人

(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6)次の症状のある人

高熱、排尿困難、むくみ

(7)次の診断を受けた人

緑内障、腎臓病

(8)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
そ の 他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2)5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

口のかわき、便秘

効能又は効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

裏面もお読みください。

用法及び用量

次の量を朝夕に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 カプセル	2 回 （朝夕）
小児（15歳未満）	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)定められた用法及び用量を厳守してください。
(2)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分及び分量

2 カプセル（成人の1日量）中

成 分	含 量	は た ら き
塩酸ブソイドエフェドリン	70mg	鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	粘液の分泌をおさえ、鼻水やなみだ目を改善します。
グリチルリチン酸	45mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	100mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます。

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、カラギーナン、赤色102号、ソルビタン脂肪酸エステルを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先

- 1）購入した薬局、薬店
2）佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
受付時間 9:00～16:30（土・日・祝日を除く）