

ご使用に際し、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎外用薬・副腎皮質ホルモン剤

エマンデ軟膏SV

特長

本剤は、炎症の患部では高い効果を持ちながら、役目を終えた後は、効果の低い物質に分解するという、治療効果と、副作用低減の両立を意図して開発された新しいタイプの副腎皮質ホルモン剤（アンテドラッグ）を主成分とし、かゆみ、皮膚炎等に確実な効果をあらわします。

⚠使用上の注意

してはいけないこと ☒

守らないと症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。
次の部位には使用しないでください。

1. 水痘、みずむし、たむし等又は化膿している患部
2. 特に顔面への、広範囲の使用、長期連用
3. 目や目の周囲

相談すること



1. 次の方は使用の前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある方
 - (2) 患部が広範囲の方
 - (3) 湿潤やただれのひどい方
 - (4) 妊婦又は妊娠している可能性のある方
 - (5) 医師の治療を受けている方
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 使用後、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合
 - (2) 使用後、患部にみずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状又は持続的な刺激感、発疹等の症状があらわれた場合
 - (3) 数日間使用しても症状の改善がみられない場合

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんま疹

【用法・用量】

- 1 日数回、適量を患部に塗擦する。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)使用量は必要最小限にとどめてください。
- (2)定められた用法、用量を守ってください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (6)塗擦後、その部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】

成 分 名	分量 (1 g 中)	作 用 等
吉草酸酢酸プレドニゾロン	1.5mg	かゆみ・湿疹・皮膚炎等に対し効果の確実なアンテドラッグ。
クロタミトン	50.0mg	皮膚病の主症状“かゆみ”を特異的に抑える。
酢酸トコフェロール	5.0mg	末梢の血流を改善し治療効果を高める。
イソプロピルメチルフェノール	1.0mg	殺菌効果により、二次感染による悪化を防止する。

刺激が少なく、患部に付着して保護作用を示す油脂性基剤。

添加物：トリエタノールアミン、クエン酸、ステアリン酸グリセリン、ワセリン
本剤は、有効成分による特有のにおいを有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口

〒930-0344 富山県中新川郡上市町森元町7-2

電話番号(076)472-0361

製造販売元 **新生薬品株式会社**
富山県中新川郡上市町森元町7-2