

効能・効果

せき、たん、
ぜんそく、
のどの炎症に
よる声がれ・
のどのあれ・
のどの不快感・
のどの痛み・
のどのほれ

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎
用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思
われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 本人または家族が
アレルギー体質の人。(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことが
ある人。(7) 次の症状がある人。高熱 (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師
または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合 (2) 5〜6回服用して

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

も症状がよくな
らない場合

成 分 成人1日量(12粒)中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩37.5mg、グアヤコールスルホン酸カリウム135.0mg、
セチルピリジニウム塩化物水和物6.0mg
添加物: リボフラビン、グリセリン脂肪酸エステル、還元パラチノース、L-メン
トール、香料、エタノール、プロピレングリコール、ベンジルアルコール

用法・用量

成人(15歳以上)および8歳以上は1回2粒、5歳以上8歳未満は1回1粒を1日
5〜6回、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用する。2時間以上の間隔
をおいて服用する。なお、5歳未満は服用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) スティックパック開封後は速やかに
服用すること。

(5) 本剤の使用期限は外装に記載して
あるので、使用期限内に服用すること。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

呼吸器科
内科

耳鼻科
内科



Nodora-Kun