

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

虫さされ・かゆみ

第2類医薬品

鎮痒消炎剤

ピナ クール液

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 湿疹やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

●効能・効果●

かゆみ、虫さされ

●用法・用量●

1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください
- (4) 定められた用法・用量を守ってください

●成分・分量● 100mL中

ジフェンヒドラミン塩酸塩…2.0g l-メントール……………3.0g
リドカイン……………0.5g dl-カンフル……………2.0g
添加物：クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、ハアセチルしょ糖、アンモニア

●保管及び取扱い上の注意●

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手が届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 火気近づけないでください
- (5) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

お問い合わせ先

本剤について、何かお買付きの点がございましたら、お問い合わせのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
東光薬品工業株式会社 お客様相談室 電話03-3855-0101
受付時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日を除く）



東光薬品工業株式会社
東京都中央区本町1丁目4番14号



東光薬品工業株式会社
東京都中央区本町2丁目1番地23号