

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

花粉・ハウスダスト等による目のかゆみ・充血に

第2類医薬品

# スタディーALG

目薬

15mL

花粉やハウスダスト等による目のかゆみ、結膜充血といったアレルギー症状に悩む人がたくさんいます。

スタディー ALGは、抗アレルギー作用のあるクロモグリク酸ナトリウムによりアレルギー症状の発現を抑制し、抗ヒスタミン剤クロルフェニラミンマレイン酸塩により起こってしまった不快な症状を和らげるアレルギー対策用目薬です。



## 使用上の注意



**してはいけないこと** (守らないと事故が起こりやすくなります)

点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります)



## 相談すること

### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

- (6) 次の診断を受けた人。

緑内障

- (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談してください。

- ・ 片方の目だけに症状がある場合
- ・ 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
- ・ 視力にも影響がある場合

### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

### 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2日間使用しても症状がよくならない場合。

### 4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## (効能・効果)

花粉、ハウスダスト（室内塵）等による次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いとき等）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）



## (用法・用量)

1回1～2滴、1日4～6回点眼してください。2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

## (用法・用量に関連する注意)

- (1)定められた用法・用量をよく守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
容器の先がまぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用してください。
- (5)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。（一旦レンズをはずしてから点眼してください）
- (6)本剤は、点眼用にのみ使用してください。

### (キャップの開閉方法)



### (正しい点眼方法)



## (成分・分量)

成 分 ・ 分 量	配 合 成 分 の 働 き
クロモグリク酸ナトリウム………1.000%	アレルギー症状を引き起こす化学伝達物質の放出を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩 ……………0.015%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみ、充血を緩和します。
添加物として、塩化ナトリウム、エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物、dl-カンフル、d-ボルネオール、pH調節剤を含有する。	

## (保管及び取り扱い上の注意)

- (1)使用後はキャップをしっかりと締めて、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限（外箱に書いてあります）の過ぎたものは、使用しないでください。
- (6)開封後はなるべく早く（2ヶ月以内に）使用してください。

## お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

東和製薬株式会社（お客様相談窓口）

電話 0120-108-871 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

販売元

 東和製薬株式会社  
和歌山县紀の川市貴志川町丸橋1229番地

製造販売元

キヨーリンリメディオ株式会社  
富山县南砺市井波885番地