

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

目のつかれ、目のかすみに

ミホエーゴールドDX

細かい作業や読書をしていて、目が疲れる、目がかすむ、物がダブって見える、頭が痛くなる、根気が無い—このような状態を眼精疲労と言います。

眼精疲労の原因にはいろいろありますが、最も多いのは歳をとるとともに目の調節機能が衰えて近くのものにピントが合わなくなることによるものです。

ミホエーゴールドDXは、ピント調節筋に働くネオスチグミンメチル硫酸塩に天然型ビタミンE、ビタミンB₆、B₁₂等を配合した目薬で、中高年から始まる「目の疲れ」、「目のかすみ」などの症状に優れた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。

はげしい目の痛み

- (5)次の診断を受けた人。

緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2)目のかすみが改善されない場合
- (3)2週間位使用しても症状がよくならない場合

(効能・効果)

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)


(用法・用量)

1日5～6回、1回2～3滴ずつ点眼してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
容器の先が、まぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので、ご注意ください。また、混濁したものは、ご使用にならないでください。
- (3)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したままご使用にならないでください。
- (5)本剤は、点眼用にのみご使用ください。

(キャップの開閉方法)



(正しい点眼方法)

容器の先が目やまつ
毛にふれないように
点眼してください。



(成分・分量)

成 分 ・ 分 量	配 合 成 分 の 働 き
酢酸 d - α -トコフェロール (天然型ビタミンE)..... 0.050%	末梢血管の血液の流れを良くし、目に栄養 を与える働きを促進します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%	目の調節機能を活発にし、目の疲れ、目の かすみを回復させる働きをします。
タウリン..... 1.000%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促して、炎症 によって損傷した目の組織修復を助けます。
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)..... 0.010%	遠近調節を行う毛様体の働きを活発にして、 目のつかれを改善します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)..... 0.050%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促進して、 目の働きを正常にする働きがあります。
コンドロイチン硫酸ナトリウム 0.100%	角膜を保護する働きと、薬の効き目を長く 持続させる働きがあります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.030%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみを抑 えます。
イプシロン-アミノカプロン酸 1.000%	炎症をしずめ、不快な症状を取り去ります。
添加物として、ホウ酸、エデト酸ナトリウム水和物、 l -メントール、 d -ボルネ オール、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、ポリオキシエチレン硬化 ヒマシ油、pH調節剤を含有する。	

(保管及び取り扱い上の注意)

- ①使用後はキャップをしっかり締めて、直射日光の当たらない涼しいところ
に保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したもの
は、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれが
ありますので、使用しないでください。
- ②小児の手の届かないところに保管してください。
- ③誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- ④汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- ⑤使用期限(外箱に書いてあります)の過ぎたものは、ご使用にならないで
ください。
- ⑥開封後はなるべく早く(2ヶ月以内に)使用してください。

★本剤の赤い色は成分のシアノコバラミン(ビタミンB₁₂)の色です。点
眼の際に衣服についても水洗いをすればシミは残りません。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発 売 元：天野商事株式会社 消費者相談室
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

電 話：(052)951-2340

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：キョーリンリメディオ株式会社 学術部
金沢市諸江町下丁287番地1

電 話：(076)239-2496

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

AMANO 天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元
キョーリンリメディオ株式会社
富山県南砺市井波885番地