

外用鎮痛消炎薬

医薬品

バンテリン[®]パップス

■使用上の注意

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

[以前お薬を使用してアレルギー症状を起こしたことがある人は、再び同じお薬を使用すると更に強い症状を起こす可能性がある。]

(2) ぜんそくを起こしたことがある人。[ぜんそくのある人がインドメタシン等の抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがある。]

(3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないこと

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	
	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

■薬効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

本製品に関するお問い合わせは

興和株式会社 医薬事業部 ぐすり相談室へお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

(1枚14cm×10cm)

6枚入

保通チャック付き(ハップ剤の乾燥を防ぎます)

「この説明文書は本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。」

■用法・用量

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

■用法・用量に関する注意

(1) 用法・用量を厳守すること。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。(3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用すること。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。

■成分・分量(膏体100g中)

インドメタシン0.5g(添加物)ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒマシ油、セラチン、カオリン、メントール、尿素、エデト酸Na、グリセリン、カルメロースNa、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビトール、酒石酸、酸化チタン、ジクロロシアルミニウムアミノアセテート、メタリン酸Na、ポリリルベート80、アジピン酸ジイソプロピル、マクロゴール

■保管及び取扱上の注意

(1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない所に密封して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開口部のチャックをきちんとしめて密封し、保管すること。(5) 使用期限(外箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

上手な貼り方



製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製 造 テイカ製薬株式会社 富山市荒川一丁目3-27



関
口