

第2類医薬品

12枚入

# バンテリン<sup>ユー</sup>パップS



薬が患部に浸透して  
筋肉・関節の痛みをとる。

高伸縮・高粘着パッド使用

ピタッと密着

タテ・ヨコ伸縮自在

# バンテリン<sup>ユー</sup>パップS

肩の痛み  
腰の痛み  
膝の痛み



肩こりに伴う  
**肩**  
の痛み



**腰**  
の痛み



**膝**  
の痛み



- スーッとする心地よい清涼感
- 貼りごたえ感のある大きさ (14cm×10cm)

12枚入

第2類医薬品

外用鎮痛消炎薬

第2類医薬品

# バンテリン<sup>®</sup>パップS

## ■使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人には使用しないこと

(1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。  
〔以前お薬を使用してアレルギー症状を起こしたことがある人は、再び同じお薬を使用すると更に強い症状を起こす可能性がある。〕

(2)ぜんそくを起こしたことがある人。〔ぜんそくのある人がインドメタシン等の  
抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがある。〕

(3)15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿  
している患部。

3.連続して2週間以上使用しないこと

### 相談すること

1.次の人には使用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)本人  
又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたこと  
がある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に  
相談すること

(1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、 熱感、乾燥感、皮下出血

(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

## ■効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、  
肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

本製品に関するお問い合わせは

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

(1枚14cm×10cm)

保湿チェック付き(パップ剤の乾燥を防ぎます。)

12枚入

この説明文書は本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

## ■用法・用量

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守すること。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている  
病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤である  
ので、症状がある場合だけ使用すること。(3)汗をかいたり、患部がぬれている  
時は、よく拭きとってから使用すること。(4)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側  
の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、  
かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。



## ■成分・分量(膏体100g中)

インドメタシン0.5g(添加物)ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒマシ油、ゼラチン、  
カオリン、トメントール、尿素、エデト酸Na、グリセリン、カルメロースNa、ポリアクリル  
酸部分中和物、D-ソルビトール、酒石酸、酸化チタン、ジヒドロキシアルミニウムアミノ  
アセテート、メタリン酸Na、ポリソルベート80、アジピン酸ジイソプロピル、マクロゴール

## ■保管及び取扱い上の注意

(1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管する  
こと。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えない  
こと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)品質保持のため、開封後の  
未使用分は袋に入れ、開口部のチャックをきちんとしめて密封し、保管すること。  
(5)使用期限(外箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

## 上手な貼り方



開け口

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
製造 テイカ製薬株式会社 富山市荒川一丁目3番27号



12枚入

第2類医薬品



お持ち帰りください