

服用される前に必ずこの文書をお読みください。また、薬とともに大切に保存してください。



平坂の鼻炎薬 D

【この薬の特徴】

眠気の少ないdークロルフェニラミンマレイン酸塩を配合し、花粉、ハウスダストなどアレルギー性鼻炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりにすぐれた効果を発揮する鼻炎薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

- 次の人は服用しないこと。
 - 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状がある人：前立腺肥大による排尿困難
 - 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。（眠気があらわれることがある。）
- 長期連用しないこと。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人：緑内障
 - モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	泌尿器
症 状	発疹・発赤、かゆみ	悪心・嘔吐、食欲不振	めまい、不眠、神経過敏	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

裏面へ続きます

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効 能】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

【用法・用量】

下記の量を1日3回、食後に水又はぬるま湯と一緒に服用すること。
服用間隔は4時間以上おくこと。

年 齢	1 回 量
大人(15歳以上)	1 包
11 歳～14 歳	2/3 包
7 歳～10 歳	1/2 包
3 歳～6 歳	1/3 包

【用法についての注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 3歳未満の乳幼児には服用させないこと。

【成分と働き】 1日量(3包 2.4g)中

成 分	分 量	成 分 の 働 き
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状を抑えます。
塩酸ブソイドエフェドリン	180mg	鼻粘膜の充血やはれを抑え、鼻水、鼻づまりを改善します。
無水カフェイン	150mg	鼻炎に伴う頭重、不快感を和らげます。

添加物として乳糖水和物、パレイシヨデンプン含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因となったり品質が変わることがある。)
- (4) 1包を分割して使用する場合は、口を折り返して保管し開封後3日を過ぎたものは服用しないで下さい。
- (5) 使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

【お客様相談窓口】 平坂製薬株式会社

TEL 095-822-2861 (土、日、祝日を除く9時から17時まで)

TEL 0120-123-728 (フリーダイヤル 2012.11以降)

製造販売元 平坂製薬株式会社 長崎市金屋町9番23号 〒850-0037
ホームページ <http://www.hirasaka.co.jp/>

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)

平坂製薬
モバイルサイト

QRコードを
読み取ってアクセス

