

ご使用に際しては、この箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

口咽咽喉薬

販売名：ゼールックのどスプレー

【成分・分量】100ml中

ポビドンヨード……………0.45g
添加物として、ヨウ化K、グリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトール液、L-メントール、アルコール、香料を含有します。
(成分・分量に関連する注意)

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 次の人は使用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 長期連用しないでください

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)次の症状のある人。口内のひどいただれ(3)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 薬液がこぼれ衣類等に付着したら、すぐに水又は洗剤で洗ってください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。
- (7) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

最初にご使用になるときは薬液が出るまで空押しを行ってください

使用
期限

製造
番号

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

製造販売元
福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824
電話：0748-52-2323
受付時間：9:00~17:00(土、祝日を除く)



30mL

のどの炎症による

痛み・ハレ・荒れ
不快感・声がれ

のど
スプレー



携帯に便利で清潔な
オーバーキャップ付き



ゼールックのどスプレー

第3類医薬品

さわやかミント味

【効能・効果】

のどの炎症によるのどあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

【用法・用量】

1 日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いてください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) のどの塗布用のみ使用し、内服しないでください。
- (4) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、声を出しながら噴射してください。
- (5) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

