

第2類医薬品



漢方煎専科

五苓散料

17

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠

漢方薬 五苓散料「タキザワ」

17D

△<使用上の注意>



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人には服用しないでください。
生後3ヶ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月位(急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5~6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

タクシャ.....6.0g ソウジュツ.....4.5g
チョレイ.....4.5g ケイヒ.....3.0g
ブクリョウ.....4.5g

1日分 (1包 11.25g × 2) 22.5g

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渴いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症: 水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹(注))のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

〈効能・効果に関する注意〉
しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回 量
成人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	成人の2/3
7歳未満4歳以上	成人の1/2
4歳未満2歳以上	成人の1/3
2歳未満	成人の1/4

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180575



製造販売元

株式会社タキザワ漢方廠
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 048-688-7923
受付時間: 9時~18時(月~金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

0120-149-931

