

漢方薬 三黄瀉心湯「タキザワ」

⚠ <使用上の注意>

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) だらだら出血が長びいている人
 - (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位(鼻血に服用する場合には5~6回、痔出血、便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

【成分・分量】

ダイオウ.....3.0g オウレン.....3.0g
オウゴン.....3.0g
1日分(1包4.5g×2)9.0g

【効能・効果】

比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神不安で、便秘の傾向のあるものの次の諸症：高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全 量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



製造販売元
株式会社 タキザワ漢方薬
さいたま市見沼区片柳412-1
お客様相談室 ☎048-688-7923
受付時間：9時～18時(月～金)



アルミ袋
個包装