




赤いニキビ、痛いニキビにしっかり効く



ニキビ治療薬クリーム

メンソレータム®アクネス® ニキビ治療薬は、「赤いニキビ」、「痛いニキビ」にしっかり効きます。

メンソレータム®アクネス® ニキビ治療薬のはたらき



1 ニキビの 芯・汚れを吸収

ニキビの頭部を開き、毛穴につまった皮脂(ニキビの芯)・汚れを吸収します。



2 ニキビの 原因菌を殺菌

ニキビの原因菌となるアクネ菌などを殺菌して積極的に治していきます。



3 ニキビの はれ・赤みをしずめる

アクネ菌などの細菌による化膿をおさえ、はれや赤みをしずめます。

ニキビを治すポイント

1 まずは洗顔。

ニキビ肌は清潔に保つことが大切です。特に、アクネ菌の大好物、皮脂をしっかり抑えなくてははいけません。ニキビに刺激を与えないようにやさしくしっかり洗いましょう。髪の毛の生え際のすずぎ残しにご注意してください。

髪の毛の生え際あたりのすずぎ残しに気をつけてネ。



2 ニキビ治療薬をこまめに使う。

指先に少量とり、ニキビにおおいかぶせるようにやさしくぬってください。



3 夜、おやすみ前のケアも、オススメ。

肌の新陳代謝が一番活発になるといわれている睡眠中のニキビ治療にもオススメです。肌負担をかけてしまう夜更かしはできるだけ避け、たっぷり睡眠をとるようにしましょう。



毎日のニキビ予防にもアクネス®シリーズ

～殺菌&消炎効果でしっかり薬用ケア～

洗う

洗顔にスピーディ
お肌をやさしく洗う
【薬用ふわふわな
泡洗顔】
販売名:アクネスFS
医薬部外品



余分な皮脂も
すっきり落とす
【薬用クリーム洗顔】
販売名:アクネスSW
医薬部外品



メイクも汚れも
一度に落とす
【薬用メイクも
落とせる洗顔】
販売名:アクネスCW
医薬部外品



大粒の角栓や
毛穴の奥の汚れも落とす
【薬用毛穴すっきり
粒つぶ洗顔】
販売名:アクネスSW
医薬部外品



防ぐ

オイルフリーのさっぱり
ニキビ予防ジェル
【薬用アクネジェル】
販売名:キャンピスアクネCb
医薬部外品



落とす

マスカラ、ファンデを
するんと落とす
【ピアクレシブ
オイル】
販売名:アクネスOL
化粧品



整える

皮脂吸収パウダー
配合でさらさら肌質に!
【薬用パウダー
化粧水】
販売名:アクネスLR
医薬部外品



ニキビ予防しながら
ぷるぷる素肌に!
【薬用モイスター
化粧水】
販売名:アクネスLM
医薬部外品



お出かけ先でも
ニキビ予防
【薬用ケータイ
アクネミスト】
販売名:アクネスK
医薬部外品



守る
【UV対策】

紫外線カット&
ニキビ予防カバー
【薬用UV
テントミルク】
販売名:アクネスTe
医薬部外品



紫外線カット&
ニキビ予防
【薬用UV
クリアミルク】
販売名:アクネスVb
医薬部外品



使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

メンソレータム®アクネス®ニキビ治療薬

ニキビ治療薬 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - ① 医師の治療を受けている人。
 - ② 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ③ 患部が広範囲の人。
 - ④ 湿潤やただれのひどい人。
 - ⑤ 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】ニキビ

【用法・用量】洗顔後に一日数回、適量を患部およびその周辺の皮フにぬってください。

（用法・用量に関連する注意）

- ① 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状（発疹・発赤、かゆみ等）があらわれた場合は使用をお避けください。
- ② 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- ③ 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。乳幼児にはご使用にならないでください。
- ④ 外用にのみ使用してください。

【成分と作用】

有効成分	分量	作用
イオウ	3%	角質軟化作用、脱脂作用、抗菌作用でニキビを治す。
レゾルシン	2%	アクネ菌を殺菌。
グリチルレチン酸	0.3%	炎症・赤みを抑える。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE誘導体)	0.5%	血行を促進し、患部の治りを助ける。

添加物として、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ペントナイト、アルコール、セルロース、CMC-Na、水酸化Al、エデト酸Na、亜硫酸水素Na、ジメチルポリシロキサン、パラベン、香料

【保管および取り扱い上の注意】

- ① 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かないところに保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- ④ 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに聴きたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

オート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

401242501