

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

目のかゆみ・充血に

# アイリスAGクール 〈目薬〉

第2類医薬品

◆アイリスAGクールは、目の炎症・充血を効果的にしずめます。さらに、爽快なさし心地で、目をスッキリさせます。



## 使用上の注意



### 相談すること



#### ① 次の人は使用前に医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。  
緑内障

#### ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |

#### ③ 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなるらない場合。

## 効能

目のかゆみ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のつかれ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

こんな時に



花粉等による  
目のかゆみや充血に



ほこりやゴミが目に入  
った時の眼病予防に



ほこりやハウスダストに  
よる目のかゆみや充血に

## 用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

### [注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6)点眼用にのみ使用してください。

## 成分

| 成分                 | 分量    | はたらき                        |
|--------------------|-------|-----------------------------|
| 塩酸テトラヒドロソリン        | 0.05% | 目の充血をおさえます。                 |
| イブシロン-アミノカプロン酸     | 1.0%  | 抗炎症作用により、目の炎症をおさえます。        |
| グリチルリチン酸二カルcium    | 0.25% |                             |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩    | 0.03% | 抗ヒスタミン作用により、不快な目のかゆみをおさえます。 |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)  | 0.1%  | 目に大切な栄養を与え、目のつかれをやわらげます。    |
| タウリン               | 1.0%  |                             |
| コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 0.1%  | 角膜の乾燥を防いで、目を保護します。          |

添加物：L-メントール、dl-カンフル、ハッカ油、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウム、クエン酸、ホウ酸、クエン酸Na、エデト酸Na、エタノール、ポリソルベート80

### [注意]

本剤の点眼後、口中に甘みを感じるがありますが、これは有効成分のグリチルリチン酸二カルciumによるものですから、ご心配ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)
- (7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用してください。



## 目薬をさす時の注意と正しいさし方

### 注意

- 容器の先がまぶたやまつ毛にふれると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

### 正しいさし方

- 手をよく洗い、目に直接指がふれないようにしてください。
- やや上を向いて指で下まぶたをさげ、まぶたの裏側にしずくを落としてください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

**連絡先** 大正製薬株式会社 お客様119番室

**電話** 03-3985-1800

**受付時間** 8:30～17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発売元



**大正製薬株式会社**

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/iris/>

製造販売元



**テイカ製薬株式会社**

富山県富山市荒川1丁目3番27号

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)