

第2類医薬品

# 漢方煎専科

## 半夏瀉心湯

14

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして  
株式会社 アキザワ漢方廠


2014年8月(記載要領変更に伴う改訂)

第2類医薬品

# 漢方薬 半夏瀉心湯「タキザワ」

17F

## △<使用上の注意>



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人には服用しないでください。

生後3ヶ月未満の乳児



### 相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人  
    むくみ
- (6) 次の診断を受けた人  
    高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔、げっぷ、胸やけに服用する場合には5~6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分・分量】

ハシゲ	5.0g	カンゾウ	2.5g
オウゴン	2.5g	タイソウ	2.5g
ショウキョウ	2.5g	オウレン	1.0g
ニンジン	2.5g		

1日分（1包9.25g×2）18.5g

### 【効能・効果】

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに恶心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

### 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年齢	1回量
大人（15歳以上）	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

### 【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180599



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方廠  
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
お客様相談室 048-688-7923  
受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

0120-149-931

