

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるように大切に保管してください。

メディケーヌU

M E D I C A N E (皮膚軟化薬) [第3類医薬品]



(2)

- 健康な皮膚は、適度の水分量を保っていますが、エアコンなどによる空気の乾燥・冷え、水仕事、老化による保水力・柔軟性の低下などの原因により皮膚表面の水分が失われると、皮膚が荒れてかさかさやコチコチの状態になります。
- メディケーヌUは、荒れた角質層にしみこんで体の中からも水分を取り込み、肌をやわらかくする「尿素」を20%、血流を改善して新陳代謝を高める「ビタミンE」、荒れで炎症をおこした皮膚のはれをしめる「クリチルリチン酸・アンモニウム」を配合した、硬くなった肌をやわらかくして乾燥した肌をしつとりさせる、荒れたお肌の治療薬です。メディケーヌUは、基剤にも保湿効果のあるスクワランを配合し、敏感肌の方にも使っていただけるよう無香料・無着色のさっぱりとした使用感のクリーム剤です。

⚠ 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- 目の周囲、粘膜等。
- 引っかき傷等のきすぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
- かさぶたの様に皮ふがはがれているところ。
- 炎症部位(ただれ、赤く腫れています)。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- 医師の治療を受けている人。
- 本人又は家族がアレルギー体质の人。
- 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 湿潤やただれのひどい人。



2. 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

- 2週間位使用しても症状がよくならない場合

【效能・効果】手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
- なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。
- 患部やその周辺を汚れたまま使用しないでください。



裏面もお読みください。

【成分・分量・はたらき】(100g中)

成 分	100g中	はたらき
尿素	20g	角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮膚にしつとり感を与えます。また、乾燥してかさかさになった角質層表面をなめらかにします。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.5g	末梢の血行を促して、皮膚表面に充分な酸素・栄養素の供給が促進されます。皮膚表面の新陳代謝が活発になり、すこやかな皮膚が生まれます。
グリチルリチン酸 -アンモニウム	0.5g	患部の炎症を、修復しながら鎮めます。

*添加物として、ステアリルアルコール、セタノール、トリエタノールアミン、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、スクワラン、パラフィンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いします。

万協製薬株式会社 TEL (0598) 37-2088

受付時間:AM10:00～PM5:00 (ただし、土、日、祝日を除きます。)

販売元

サンドラッググループ®

発売元

houyu ホーユー株式会社

名古屋市東区徳川一丁目501

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142