

T12



成分・分量 1.0mL中

dL-カンフル…1.80g トメントール…4.50g サリチル酸メチル…9.00g ハッカ油…1.20g
 D-トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.60g ニル酸ワニリルアジド…0.01g
 添加剤: ポリブタン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭水化物カル
 シウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシ
 エチレンニルフェールエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号 含有

第3類医薬品

富士薬品

タイラップE[®]
 こりと痛みに

●患部の血行を改善して痛みを鎮める

タイミンE配合

関節痛

腰痛

肩こり

貼付剤 16枚入り

Waist
 肩こり
 Shoulder

ここから開けてください
 タイミンE配合
 第3類医薬品

第3類医薬品

タイラップE

タイミンE配合

関節痛

腰痛

肩こり

02A171

こりと痛みに タイラップE

第3類医薬品

△使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
 (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 発疹、かぶれ、傷口

■相対すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 薬をによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 皮膚で発疹・発赤、かゆみ、腫み
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合も使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

お客様相談窓口 大協薬品工業株式会社
 TEL 076-479-1313 (土、日、祝日を除く)



(01)14987524122414(93)2701

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨節痛

用法・用量

- 1日1～2回ライナーをはがし、患部に貼ってください。(用法・用量に関連する注意)
- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (6)皮膚の弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手が届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(調剤の原因になり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

16枚入り(1枚の寸法7.4cm×5.2cm)

製造販売元 TTK 大協薬品工業株式会社

京山市本橋南町1-7-3

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

タイラップE
 タイミンE配合
 第3類医薬品