



成分・分量 1.0ml中
dl-カンフル…1.80g l-メントール…4.50g サリチル酸メチル…9.00g ハッカ油…1.20g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.50g ノニル酸ワニリルアド-0.01g
添付剤：ポリブテン、生ゴム、ボリソブチレン、エクシルガム、テルペン樹脂、沈没炭酸カル
シウム、酸化チタン、アクリル酸メチル/アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシ
エチレンノノルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号 含有

このヒ痛症にアドレナリン 第3類医薬品

第3類医薬品

OCA***

第3類医薬品

富士薬品

●患部の血行を促進して痛みを軽減する

ヒートミクシタ

ヒートミクシタ
Waist Shoulder

ヒートミクシタ

ヒートミクシタ

脚筋痛

腰痛

肩こり

貼付箇所
16枚入
1枚あたり約1.4g

ビタミンE配合
ヒートミクシタ

ここから開けてください

第3類医薬品

第3類医薬品

ヒートミクシタ

ヒートミクシタ

脚筋痛

腰痛

肩こり

外用鎮痛消炎薬

ヒートミクシタ

第3類医薬品

△使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後の次の症状があわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

皮膚：発疹、発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

お客様相談窓口 大協薬品工業株式会社
電話: 076-479-1313 (土、日、祝日を除く)



(01)14987524122414 (93)2801

効能・効果

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋筋疲労

用途・用量

1日1~2回(1枚/1回)をはがし、患部に貼ってください。

〈用途・用量〉に記載する注意

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児はお使いの場合は、保護者の指導監督のもとにしてさせてください。

(3)手足の裏や腰の裏や電気毛布等で温めないでください。

(4)汗かかず、腰部がぬれている時は、よくさり取ってからお使いください。

(5)入浴後、温熱成分による刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には、はがしてください。

(6)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半目以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてからお使いください。

(7)皮膚の弱い人は、同じ部位に継続で貼ることをさせてください。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼氣の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)開封後は袋に入れるまでは、あくまで「開封の原因にならない」品質が変わらなければなりません。

(4)開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品はお使いになくください。

16枚入り(1枚の寸法7.4cm×5.2cm)

製造販売元 大協薬品工業株式会社
富山市水橋町等173

副作用被害救済制度 電話: 0120-149-931