

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
必要な時に読めるよう大切に保存してください。

生薬製剤

第2類医薬品

ちよう じょう かん たん げん か りゅう

長城冠丹元顆粒

中年以降または高血圧傾向のある方の頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸の改善を目的とした生薬製剤です。



【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	下痢、悪心、嘔吐、食欲不振、胃痛、腹部膨満感
そ の 他	異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

【効能・効果】

中年以降または高血圧傾向のあるものの次の諸症：

頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸

【用法・用量】

次の1回量を1日3回、食間または空腹時に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。

(裏面へ続く)

〔成分・分量〕

1日服用量3包(9g)中に、下記の混合生薬より製した冠丹元エキスを4.5gを含有します。

タンジン (丹 参) …… 4.5 g

センキュウ (川 芎) …… 2.25 g

シャクヤク (芍 薬) …… 2.25 g

コウカ (紅 花) …… 2.25 g

モッコウ (木 香) …… 1.125 g

コウブシ (香附子) …… 1.125 g

添加物として乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕


(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

アスゲン製薬株式会社 医薬安全情報課

名古屋市東区泉二丁目28-8 電話：0120-935-758(フリーダイヤル)

受付時間 午前9：00～午後5：00(土日、祝日を除く)

発売元 **日邦薬品工業株式会社** 東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 **アスゲン製薬株式会社** 名古屋市東区泉二丁目28-8

原産国 **中 華 人 民 共 和 国**