

下痢・食あたりに **赤玉はら薬** **使用上の注意****相談すること**

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - 高齢者。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

5～6日間服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15 歳以上	10 粒	食前に3回
11 歳以上 15 歳未満	7 粒	
8 歳以上 11 歳未満	5 粒	
5 歳以上 8 歳未満	4 粒	
3 歳以上 5 歳未満	3 粒	
3 歳未満	服用させないでください。	

- 【注意】(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

1日量(30丸)中

成分・分量

成 分	分 量	作 用
タンニン酸ベルベリン	120mg	止瀉作用により、下痢にすぐれた効果をあらわします。
アクリノール	60mg	静菌・殺菌作用があり、食あたり・水あたりに効果をあらわします。
ゲンノショウコ乾燥エキスS	300mg	止瀉薬・整腸薬としてはたらき、便通を整えます。
センブリ末	30mg	苦味健胃生薬及び整腸薬として、消化不良に効果をあらわします。
添加物として、炭酸Ca、カルメロースCa、デヒドロ酢酸Na、コメデンブ、カルメロースNa、パレイシヨデンブ、タルク、セラック、マクロゴール、赤色102号を含有。		

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します)
- 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お客様相談窓口 電話076-493-5010
月～金(祝祭日を除く)9時～17時

製造販売元



中央薬品株式会社
富山県富山市西四十物町4-9