

下痢・食あたりに **赤玉はら薬** **使用上の注意****相談すること**

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - 高齢者。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
  - 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

**効能・効果**

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

**用法・用量**

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	10粒	食前に3回
11歳以上15歳未満	7粒	
8歳以上11歳未満	5粒	
5歳以上 8歳未満	4粒	
3歳以上 5歳未満	3粒	
3歳未満	服用させないでください。	

- 【注意】**(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

**成分・分量**

1日量(30丸)中

成 分	分 量	作 用 用
タンニン酸ベルベリン	120 mg	止瀉作用により、下痢にすぐれた効果をあらわします。
アクリノール	60 mg	静菌・殺菌作用があり、食あたり・水あたりに効果をあらわします。
ゲンノショウコ乾燥エキスS	300 mg	止瀉薬・整腸薬としてはたらき、便通を整えます。
センブリ末	30 mg	苦味健胃生薬及び整腸薬として、消化不良に効果をあらわします。

添加物として、炭酸Ca、カルメロースCa、デヒドロ酢酸Na、コメデンプン、カルメロースNa、バレイショデンプン、タルク、セラック、マクロゴール、赤色102号を含有。

**保管及び取扱い上の注意**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します)
- 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お客様相談窓口 電話076-493-5010  
月～金(祝祭日を除く)9時～17時

製造販売元



**中央薬品株式会社**  
富山県富山市西四十物町4-9