

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鼻炎薬

1日2回の持続性鼻炎薬

パミコール「鼻炎」SR

塩酸プソイドエフェドリン配合

- パミコール「鼻炎」SRは、塩酸プソイドエフェドリンをはじめとする各成分がすぐれた効果を発揮し、アレルギー性鼻炎のくしゃみ、鼻水、鼻づまり等の不快な諸症状を緩和します。持続性タイプですので、朝夕1日2回の服用で効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）


4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、腎臓病
- (8) モノアミン酸化酵素阻害剤（塩酸セレギリン等）で治療を受けている人。



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
そ の 他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い



用法・用量

次の1回量を朝夕に水又はお湯で服用してください。

年 齢	成人(15歳以上)	7歳～14歳	7歳未満
1回量	2カプセル	1カプセル	服用しないでください
服用回数	1日2回		

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて表面のアルミ箔を破り、取り出してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分・分量


4カプセル中

はたらき	成 分	分 量
鼻粘膜の充血・はれをおさえ、鼻づまりを改善します	塩酸ブソイドエフェドリン	120mg
アレルギー症状(くしゃみ、鼻水等)をおさえます	マレイン酸クロルフェニラミン	8mg
鼻水・なみだ目をおさえます	ペラドンナ総アルカロイド	0.4mg
鼻粘膜の炎症をおさえます	グリチルリチン酸	45mg
鼻炎に伴う頭重をやわらげます	無水カフェイン	100mg

添加物：トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、セルロース、カルメロースCa、エチルセルロース
カプセル本体に赤色102号、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステル

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 開封後は湿気をおびやすいので、アルミ袋の切り口を折り返して保管してください。
- (5) 使用期限(外箱又はアルミ袋に記載)を過ぎた製品は、服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

TEL 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2