

Throat
Disinfectant **第3類医薬品**

のど用殺菌消毒薬

販売名:のどぬーるスプレー EXクール

[効能・効果] のどの殺菌・消毒

[用法・用量] 1日数回、適量を患部に

噴射してください

<用法・用量に関する注意>

(1)ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)(2)小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用されること(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(4)のど用にのみ使用すること(5)薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

[成分・分量] 100mL中

ヨウ素—————0.5g

添加物として、ヨウ化K、グリセリン、プロピレンギリコール、エタノール、I-メントールを含有する

<成分・分量に関する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがある

火気厳禁

第二石油類 危険等級III

プロピレンギリコール含有物 水溶性

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器ラベルに記載)
を過ぎた製品は使用しないこと

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)
1.次の人には使用しないこと (1)本剤または本剤の成分、ヨウ素(ポビドンヨード)によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)甲状腺疾患のある人 (3)2才未満の乳幼児 (4)妊娠または妊娠していると思われる人 (5)授乳中の人は

2.長期連用しないこと 3.大量に噴射しないこと

相談すること

1.次の人には使用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1)医師または歯科医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3)次の症状のある人:口内のひどいただれ

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
アナフィラキシー 様症状	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさなどがあらわれる

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は
使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに、キャップをしっかりとしめて立てて保管すること (2)小児の手の届かないところに保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる) (4)火気に近づけないこと(プロピレンギリコール含有物)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること ●携帯する場合は、添付のビニール袋に入ること

●使用中に薬液がこぼれ衣類などが着色したら、すぐに水洗いすること ●液が出ないときは、液が出るまで数回空押しすること

●温度の低い場所で保管された場合、液が出にくいときがある
その場合は手のひらなどで温めてから使用すること

その他の注意

●噴射するとき、ポンプの頭部はゆっくり押してください。速く押すと液がはね返って飛び散ることがありますのでご注意ください
●ノズルの先端を針などで突くと折れたとき大変危険ですので絶対におやめください

製品のお問合せは、お買い求めのお店
またはお客様相談室にお願いいたします

＼あつたらしいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3