

【販売名】
ホニカツジン錠

第2類医薬品

薬効名:漢方薬

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭痛、耳鳴り)、軽い尿漏れ

用法・用量

次の量を食間[※]に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

※「食間」とは食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤18錠(3.6g)中(ケイヒ0.50g・サンシュユ1.5g・サンヤク1.5g・ジオウ2.5g・タクシャ1.5g・フクリョウ1.5g・ポタンビ1.5g・ブン末0.50g)八味地黄丸エキス(1/2量)1.65g
添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要時に読めるよう保管しておいてください。

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと。
(1)胃腸の弱い人。
(2)下痢しやすい人。

⚠️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp> ☎ 0120-149-931

だいにち堂

類尿 夜間尿 残尿感
むくみ 高齢者のかすみ目
下肢痛 腰痛 しびれ
高血圧に伴う随伴症状
(肩こり、頭痛、耳鳴り)

※体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿の方

はつぼうのさい

八宝之才

ホニカツジン錠

第2類医薬品

540錠 30日分

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)。
4. ぬれた手で触れないでください。又、一度取り出して手に乗せた錠剤は元に戻さないでください(変質防止のため)。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元 株式会社だいにち堂
長野県安曇野市穂高柏原2843-28

製造販売元 剂盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

本製品についてのお問い合わせは、
下記にお願い申し上げます。

だいにち堂

問合せ先

電話 0120-315-531
月～金/9:00～12:00、13:00～18:00