

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

## 【漢方薬】柴胡桂枝乾姜湯

### ホノミキョウキョ錠

第2類医薬品

販売名：ホノミキョウキョ錠

540錠

#### ▲ 使用上の注意



##### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 高齢者
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人：むくみ
  - 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3ヵ月位(かぜの後期の症状)に服用する場合には5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【効能・効果】

体力中等度以下で、冷え症、貧血気味、神経過敏で、動悸、息切れ、ときにねあせ、頭部の発汗、口の乾きがあるものの次の諸症：更年期障害、血の道症<sup>注</sup>、不眠症、神経症、動悸、息切れ、かぜの後期の症状、気管支炎

注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

#### 【用法・用量】

次の量を食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	4 錠	
7 歳未満 5 歳以上	3 錠	
5 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 【成分・分量】 18錠(3.6g)中

オウゴン …… 1.5g  
カロコン …… 1.5g  
カンキョウ …… 1.0g  
カンゾウ …… 1.0g  
ケイヒ …… 1.5g  
サイコ …… 3.0g  
ボレイ …… 1.5g

柴胡桂枝乾姜湯水製エキス …… 1.430g

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

販 売 元 PharmaX株式会社  
東京都新宿区四谷三栄町3-11  
中村ビル101

お客様相談窓口: ☎03-4500-2141  
公式LINEではいつでも薬剤師に  
ご相談が可能です



製造販売元 劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931