

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

## 【漢方薬】防風通聖散 ホノミサンイン®錠

第2類医薬品

販売名：ホノミサンイン錠

540錠

### △ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢、便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

**【効能・効果】** 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

**【用法・用量】** 次の量を食前又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	4 錠	
7 歳未満 5 歳以上	3 錠	
5 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【成分・分量】** 18錠(3.6g)中

(オウゴン1.0g・カッセキ1.5g・カンゾウ1.0g・キキョウ1.0g・ケイガイ0.60g・サンシシ0.60g・シャクヤク0.60g・ショウキョウ0.20g・セッコウ1.0g・センキュウ0.60g・ダイオウ0.75g・トウキ0.60g・ハッカ0.60g・ビャクジュツ1.0g・ポウショウ0.75g・ポウフウ0.60g・マオウ0.60g・レンギョウ0.60g)防風通聖散エキス(1/2量)2.0g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果が変わりはありません。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

販 売 元 PharmaX株式会社  
東京都新宿区四谷三栄町3-11  
中村ビル101

お客様相談窓口：☎03-4500-2141  
公式LINEではいつでも薬剤師にご相談が可能です



製造販売元 劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

セルフメディケーション  
税 控 除 対 象