

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】大柴胡湯

ホノミジツキョウ[®]錠

第2類医薬品

販売名：ホノミジツキョウ錠

540錠

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1ヵ月位(常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘)に服用する場合には5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【用法・用量】

次の量を食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 18錠(3.6g)中

オウゴン	1.5g	} 大柴胡湯エキス(1/2量) …1.460g
キジツ	1.0g	
サイコ	3.0g	
シャクヤク	1.5g	
ショウキョウ	0.5g	
ダイオウ	0.5g	
タイソウ	1.5g	
ハンゲ	2.0g	

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

販売元 PharmaX株式会社
東京都文京区本郷5-25-18
ハイテック本郷ビル102

お客様相談窓口：☎03-4500-2141
公式LINEではいつでも薬剤師にご相談が可能です



製造販売元 劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号