

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】 ホノミフツケツ[®]EX錠

第2類医薬品

252錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	4 錠	
7 歳未満 5 歳以上	3 錠	
5 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【効能・効果】 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症[※]、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

【成分・分量】 18錠(3.6g)中
(ケイヒ2.0g・シャクヤク2.0g・トウニン2.0g・ブクリョウ2.0g・ボタンピ2.0g)桂枝茯苓丸エキス(1/2量)0.950g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプン含有します。本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 袋の中に乾燥剤を入れてあります。誤って服用しないよう注意してください。
- 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

【発売元】 株式会社MORI PHARMACY
東京都豊島区北大塚3-25-16伊納ビル2F
問合せ先：090-7519-2946
(平日10時～19時)

【製造販売元】 劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931