

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】

ホノミホイオー<sup>®</sup>錠

第2類医薬品

252錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【効能・効果】 体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

【成分・分量】 18錠(3.6g)中  
(オウギ2.00g・カンゾウ0.75g・サイコ0.50g・ショウキョウ0.25g・ショウマ0.25g・タイソウ1.00g・チンピ1.00g・トウキ1.50g・ニンジン2.00g・ビャクジュツ2.00g) 補中益気湯エキス(1/2量)1.700g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプン含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますが、効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 袋の中に乾燥剤を入れてあります。誤って服用しないよう注意してください。
- (5) 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

【発売元】 株式会社MORI PHARMACY  
東京都豊島区北大塚3-25-16伊納ビル2F  
問合せ先：090-7519-2946  
(平日10時~19時)

【製造販売元】 劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931