

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】

ホノミリキ[®]錠

第2類医薬品

252錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕 18錠(3.6g)中
(カンゾウ0.5g・ショウキョウ0.25g・タイソウ1.0g・チンピ1.0g・ニンジン2.0g・ハンゲ2.0g・ビャクジュツ2.0g・ブクリョウ2.0g)六君子湯エキス(1/2量)1.200g
添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 袋の中に乾燥剤を入れてあります。誤って服用しないよう注意してください。
- 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

〔発売元〕 株式会社MORI PHARMACY
東京都豊島区北大塚3-25-16伊納ビル2F
問合せ先: 090-7519-2946
(平日10時~19時)

〔製造販売元〕 劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。