

この説明文書は、本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

第3類医薬品

肉体疲労時のビタミンB₁B₆B₁₂の補給
肩こり、眼精疲労に

ノイビタZE

ビタミンB₁誘導体「オクトチアミン(ビタミンB₁+チオクト酸(α リポ酸))」配合
ビタミンB₁B₆B₁₂主薬製剤

ノイビタZEの特徴

1. ビタミンB₁誘導体「オクトチアミン」は体内で「ビタミンB₁」、「チオクト酸(α リポ酸)」の2つの活性物質となり、ビタミンB₆・B₁₂と協力しあって神経や体の組織に作用し、肉体疲労・肩こり・眼精疲労に優れた効き目をあらわします。
2. ニコチン酸とビタミンEの2つの成分が血行を促進し、ビタミンB群を体の隅々まで届けるとともに肩や目の奥の緊張を和らげて、肩こり・眼精疲労にも優れた効果を発揮します。
3. パントテン酸カルシウムがビタミンB群と共に代謝機能を高めます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃部不快感、口内炎
精神神経系	頭痛
その他	動悸

(2) 1か月位服用しても症状がよくなりません

2. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください

軟便、下痢、便秘、顔面・皮ふの紅潮

〈ニコチン酸の作用について〉

本剤の有効成分の一つであるニコチン酸は末梢血管拡張作用があり、人によってはこの作用が強くあらわれて、顔面の紅潮(顔が赤くなったり、ほてる)・皮ふの紅潮が起こることがありますが、紅潮は通常、一過性で、数時間で消失します。

一般的にこの症状は食事直後に服用することにより、その発現が低下することが知られています。

なお、この紅潮が継続または増強する場合は、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

効能・効果

- 次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時
- 次の諸症状の緩和：
眼精疲労、筋肉痛・関節痛（肩こり、腰痛、五十肩など）、神経痛、手足のしびれ
「ただし、これらの症状について、1か月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師にご相談ください」

用法・用量

次の量を、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2～3錠	1回
11歳～15歳未満	1～2錠	
7歳～11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本剤は、黄色の糖衣錠で、3錠中に次の成分を含有する。

オクトチアミン（ビタミンB₁誘導体）…………… 100mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）…………… 100mg
シアノコバラミン（ビタミンB₁₂）…………… 1500μg
コハク酸 *d*-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）…………… 100mg
ニコチン酸…………… 32mg
パントテン酸カルシウム…………… 30mg
添加物：乳酸カルシウム水和物、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Ca、セルロース、ステアリン酸Mg、セラック、ヒマシ油、白糖、アラビアゴム、タルク、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リボフラビンリン酸エステルナトリウム、カルナウバロウ

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わる。）
- (4) 水分が錠剤につくと、表面が変色したり、斑点が生じることがあります。ぬれた手で触れたものを容器に戻さないでください。
- (5) 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨ててください。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電 話 03 (6667) 3232
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

ホシエヌ製薬株式会社

奈良県五條市住川町1380番地