

この添付文書は、使用前によくお読みください。
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

コフチールこどもせきどめシロップ

コフチールこどもせきどめシロップは、せきが出たり、のどにたんがからむような不快な症状に優れた効果を発揮するように、キキョウ流工キス・セネガ流工キス・オウヒ流工キスを中心に、7種類の成分を配合した、飲みやすいシロップ剤です。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関 係 部 位	症 状
皮 膚 (ふ)	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

次の1回量を添付の目盛り付きコップで量り、1日3回毎食後及び就寝前に服用してください。また、1日6回まで服用しても支障ありませんが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。

年 齢	1回量
8歳以上11歳未満	10mL
5歳以上8歳未満	6.5mL
3歳以上5歳未満	5mL
1歳以上3歳未満	4mL
3ヵ月以上1歳未満	2mL
3ヵ月未満	服用しないでください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量と作用】

1日量(60mL)中

成 分	分量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	15 mg	せき中枢に作用してせきをしずめ、呼吸を楽にします。
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	37.5 mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	135 mg	気道粘液の分泌をたかめ、粘りついているたんをうすめてはき出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6 mg	アレルギーが原因となって起こるせきをしずめます。
キキョウ流工キス (原生薬換算量：600mg)	0.6mL	たんをうすめてはき出しやすくします。
セネガ流工キス (原生薬換算量：600mg)	0.6mL	気道粘液の分泌をたかめ、粘りついているたんをうすめてはき出しやすくします。
オウヒ流工キス (原生薬換算量：600mg)	0.6mL	せきをしずめ、たんをはき出しやすくします。

添加物として、塩化Na、白糖、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、バラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、ポリリン酸Na、リン酸二水素Na、メタリン酸Na、赤色2号、香料、バニリン、エチルバニリン、グリセリンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振って服用してください。
- (6)服用のつど、ピンの口をよく拭き、フタをしっかりとめておいてください。
- (7)いったん開栓した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8)添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824