



第3類医薬品

ビタエース「ゴールド」錠

ビタミンB₁主薬製剤

特 徴

- クミアイ ビタエース「ゴールド」錠は、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合したビタミンB₁主薬製剤です。
- ビタミンB₁誘導体であるフルスルチアミン塩酸塩が関節痛、神経痛、手足のしびれなどをやわらげます。
- コンドロイチン硫酸エステルナトリウムが関節部の潤滑油となり、関節痛をやわらげて動きをスムーズにします。
- 飲みやすい小さなフィルムコーティング錠です。



使用上の注意

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を、朝昼晩、食後に服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
15歳以上	3 錠 	1日3回
11歳～14歳	2 錠 	
7歳～10歳	1 錠 	
7歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量(9錠)中

成 分	含 量	は た ら き
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB ₁ 誘導体)	109.16mg	糖質をエネルギーに変えたり、関節痛や神経痛などの症状を緩和するビタミンB ₁ の誘導体で、吸収性と持続性に優れています。
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB ₂)	12mg	三大栄養素、特に脂質を効果的にエネルギーに変えます。持続性のあるビタミンB ₂ です。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	30mg	たんぱく質をエネルギーに変える他、神経の伝達にも関与します。
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	60μg	神経の伝達をスムーズにするビタミンです。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	900mg	保水力に富み、関節部分の潤滑油の役目を果たします。グルコサミンを原料として体内でも生成され、関節を正常な状態に保つことで関節痛や神経痛を緩和します。

添加物として、塩酸グルコサミン、セルロース、ケイ酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三二酸化鉄を含有する。

<成分・分量に関連する注意>

リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂)により尿が黄色くなることがありますが、心配はありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 服用のつどキャップをよくしめてください。
- (5) ビンの中の詰め物は、キャップをあけた後は捨ててください。
(詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものです。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930