

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

オムネド・ケトプロフェンパップ

第1類医薬品

【特 長】

- 腰痛、肩こりに伴う肩の痛みなどに、ケトプロフェンと α -メントールのWの働きで優れた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等を含む)を起こしたことがある人。

(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

(3) 次の医薬品によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

チアプロフェン酸、スプロフェン、フェノフィブラート

(4) 次の添加物によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

オキシベンゾン

(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(6) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 傷口。(3) 湿疹、かぶれ。

(4) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 本剤の使用中は、天候にかかわらず、戸外活動を避けるとともに、日常の外出時も本剤の貼付部を衣服、サポーター等で覆い、紫外線に当てないでください。

なお、使用後も当分の間、同様の注意をしてください。(紫外線により、使用中又は使用後しばらくしてから重篤な光線過敏症があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合

まれに重症化して発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合がありますので、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、患部を

遮光して医師の診療を受けてください。なお、使用後しばらくしてから症状があらわれることがあります。また、紫外線により症状があらわれたり、悪化したりすることがあります。

関係部位	症 状
皮 膚 (患部)	発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激感、水疱・ただれ、色素沈着、皮膚乾燥

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。
接触皮膚炎、 光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることもある。

(2) 1週間程度使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 関節痛、腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、打撲、捻挫

【用法・用量】

15歳以上	プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
15歳未満	使用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。

(2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】 膏体100g(1400cm²) 中

ケトプロフェン……0.300g α -メントール……0.500g

添加物として、クロタミソ、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ミリスチン酸

イソプロピル、CMC-Na、ポリアクリル酸部分中和物、カオリン、酸化チタン、

グリセリン、エデト酸Na、ゼラチン、pH調整剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)

(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックをきちんとしめて、外気にふれないようにしてください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〈包 装〉

18枚入(6枚×3袋) 1枚:14cm×10cm



使用中および使用後少なくとも4週間は貼付部を紫外線にあてないでください。



副作用被害救済制度
☎0120-149-931

〈お問い合わせ先〉

帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)



4 987373 064562

ここを押して
開けて下さい。