


使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。


目がコロコロ・チクチクする時に

ROHTO 【ロートクリア】 ROHTOCLEAR 眼科薬 13mL

目の炎症による異物感・充血に



目への強い負担が続くと...



目の細胞に炎症が起こり、異物感を感じるようになります。

※イラストはイメージ図です。

炎症原因物質

“プロスタグランジン”の生成を抑制。

パソコンの長時間使用、目の乾燥、コンタクトレンズによる刺激など、目に強い負担をかけ続けると、目の細胞はダメージを受けてしまいます。ダメージを受けた細胞からは炎症原因物質“プロスタグランジン”が生成され、炎症を起こすことで、目がコロコロ・チクチクするような異物感を引き起こしてしまいます。「ロートクリア」は、抗炎症成分プラノプロフェンが炎症の原因物質の生成を抑え、症状を効果的に鎮めます。目のコロコロ・チクチクが気になる時には「ロートクリア」。



18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された“解体新書”。その開拓の思想のもとに、ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきたノウハウと最新技術で酷使される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は、使用しないこと

(1) 7才未満の小児 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人

相談すること

1. 次の人は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、刺激感、異物感、なみだ目、目やに
その他	息苦しさ

- (2) 症状が悪化した場合
- (3) 目のかすみが改善されない場合(緑内障等の可能性も考えられる)
- (4) 3日位使用しても症状がよくならない場合
- (5) 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合

効能・効果

目の次の症状の緩和：異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、目のかゆみ、結膜充血、なみだ目、目やにの多いときの目のかすみ

用法・用量

1回1～2滴、1日4回点眼してください。7才未満の小児には使用しないでください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(一旦レンズをはずしてから点眼してください。)
- (4) 点眼用にのみ使用してください。
- (5) 用法・用量を厳守してください。



成 分

ブロナプロフェン……………0.05% 添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、BHT、塩化ベンザルコニウム、*l*-メントール、dl-カンフル、ポリソルベート80を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

400557702