

イソビタンD²

成分・分量 1日量1本(100mL)中
チアミン硝酸物……………10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム3mg
ピリドキシン塩酸塩……………50mg
ニコチン酸アミド……………30mg
無水カフェイン……………50mg
L-アルギニン塩酸塩……………40mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム……………1000mg
ローヤルゼリー……………50mg
添加物：白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、安息香酸Na、エデト酸Ca/2Na、香料、ビタミンE、バニリン、エタノール

●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。
- 本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

金属：キャップ ガラス：瓶

ローヤルゼリー配合

肉体疲労時の栄養補給

イソビタンD²

第3類医薬品

100mL

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

滋養強壮・虚弱体質

使用上の注意

相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

(お客様相談室)06-6203-5151 受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

KL06

使用期限

製造番号