

かゆみに速く効く

かゆい 粉ふき肌 治療薬



乾燥による肌トラブルに

FERZEA®

フェルゼア
DX20 ローション

2つの
かゆみ止め
成分

&
保水し、角質を
やわらかく戻す成分

尿素
20%
配合

フェルゼアDX20ローション

第2類医薬品

乾燥性皮膚用薬

【効能】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)
※小児(15歳未満)は使用できません。

【成分(100g中)】

尿素20.0g、ジフェンヒドラミン1.0g、リドカ
イン2.0g、グリチルリチン酸二カリウム0.5g、
トコフェロール酢酸エステル0.5g

添加物として、ジメチルポリシロキサン、1,3-ブ
チレングリコール、グリセリン、硬化油、ミリス
チン酸イソプロピル、乳酸、水酸化Na、エデト
酸Na、パラベン、L-メントール、ヒアルロン酸Na、
カルボキシビニルポリマー、ペンタステアリン
酸デカグリセリル、ステアリン酸マクロゴール、
その他1成分を含有。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れな
いください。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気
の少ない涼しい所に密栓して保管してくだ
さい。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用
の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでくだ
さい。なお、使用期限内であっても一度開
封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 金属(メガネ、時計、アクセサリー等)、木材
(白木、床や家具等の塗装面等)、衣類など
に付着すると変質又は変色する場合がある
ので注意してください。

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先 電話:0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

MADE IN JAPAN

なめらかな肌ざわりの
〈スムーズタッチ尿素製剤〉

第2類医薬品

押してあける

使いやすい
ポンプタイプ



こんな症状に。「医薬品」で治す!



お風呂上がりや
寝る前にかゆくなる



かゆみをくり返す乾燥肌




白く粉をふいた
カサカサかゆみ肌

2つのかゆみ止め成分配合 かゆみをすばやく止める

&

尿素20%配合 尿素が保水し、硬くなった肌をやわらかく戻す

●尿素 ●水分 (イメージ図)



尿素が水分を
引き寄せる

古い角質がやわらかく
なって剥がれる


うるおいのある
本来のなめらかな肌に

- ・炎症を鎮める成分&血行を促進する成分配合
- ・我慢できないかゆい粉ふき肌にスーッと心地良い清涼感
- ・塗り広げやすいローションタイプ
- ・無香料、無着色

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

- ①使いはじめは、図のように、キャップを手でおさえ、ノズルを持ち上げるように左方向に回しながら、上げてください。
※逆方向に回すと、ノズルが上がらなくなることがあります。ご注意ください。
- ②ノズルが上がったら、図のように、中身が出るまで数回押ししてください。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)化粧品ではありませんので、効能で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

スムーズタッチ尿素製剤とは・・・

尿素は肌へ塗ったときにザラついたり、肌なじみがよくない場合がありますが、フェルゼアは、優れた技術で尿素を溶かし込んでいるため、ザラつきや肌なじみを改善し、なめらかな肌ざわりで心地よくお使いいただけます。

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください

- (1)目のまわり、粘膜等。
- (2)引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4)炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください