

第3類医薬品

目薬



目の疲れ、充血、かすみに

モロールE[®]

製品の特徴

モロールEは、血行を促進するビタミンE、新陳代謝を促進するビタミンB₆を配合し、パソコンや車の運転などによる目の疲れ、充血、かすみを改善します。

また、目の炎症やかゆみを抑える成分を配合し、目に潤いを与えるさわやかなさし心地の目薬です。



目の疲れ



結膜充血



目のかすみ

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み。
 - 4) 次の診断を受けた人。
緑内障。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 目のかすみが改善されない場合。
 - 2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931

成分分量 100mL中

成 分	分 量	は た ら き
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	100mg	目の新陳代謝を活発にします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	10mg	目のかゆみや炎症を抑えます。
トコフェロール酢酸 エステル (ビタミンE)	15mg	血行を促進し、目への栄養補給を 助けます。
グリチルリチン酸 二カリウム	100mg	炎症を抑えます。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	200mg	角膜など目の組織の成分で、目に 潤いを与えます。

添加物としてホウ酸、l-メントール、ベンザルコニウム塩化物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ホウ砂、d-ボルネオール、ゲラニオールを含有する。

用法用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼する。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (4) 点眼用にのみ使用すること。

効能効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）。

保管及び取扱上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して同封の袋に入れて保管すること。特に車中・暖房器具の近くなど40℃以上になる場所に放置しないこと（高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがある）。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 汚染をさけるため、他の人と共用しないこと。
5. 表示の使用期限を過ぎたものは使用しないこと。また、使用期限の範囲内であっても、内袋開封後はなるべく早く使用すること。
6. 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用すること。

〔問い合わせ先〕

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)

発 売 元  **日水製薬株式会社**
東京都台東区上野3-24-6

製造販売元  **滋賀県製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町湯879