

# リキセー2000

〔成分・分量〕 1日量1本(100mL) 中  
硝酸チアミン ..... 10mg  
リン酸リボフラビンナトリウム ..... 3mg  
塩酸ピリドキシン ..... 10mg  
ニコチン酸アミド ..... 10mg  
無水カフェイン ..... 50mg  
アミノエチルスルホン酸 ..... 2000mg  
(タウリン)  
L-アスパラギン酸  
マグネシウム・カリウム ..... 200mg  
黄精流エキス ..... 0.1mL  
(オウセイ100mgに相当)

添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、カラメル、香料、エチルバニリン、L-メントール、グリセリン、バニリン、プロビレンギリコール

●本剤に配合されているリン酸リボフラビンナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

## 〔用法・用量〕

成人(15歳以上) 1日1回1本(100mL) を服用する。

●用法・用量を厳守すること。(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)

●本剤は、まれに沈殿を生じることがあります。よく振って服用すること。

製造販売元 TL01

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〔お客様相談室〕 0120-4193-95

滋養強壮・虚弱体质  
肉体疲労時の栄養補給に 100mL



# リキセー 2000

医薬部外品

## 〔使用上の注意〕

### 相談すること

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。(1)本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合。

### 〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体质、  
肉体疲労・病中病後・  
食欲不振・栄養障害・  
発熱性消耗性疾患・  
産前産後などの場合の栄  
養補給。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管す  
ること。(2)小児の手  
の届かない所に保管す  
ること。(3)他の容器  
に入れ替えないこと。

(誤用の原因になった  
り品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用  
しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用期限

製造番号

4 904751110895