

〔成分・分量〕

1日量1本(100mL)中
 タウリン……………3000mg
 ローヤルゼリー抽出液…………200mg
 (ローヤルゼリー200mgに相当)
 L-アルギニン塩酸塩…………40mg
 チアミン硝化物…………10mg
 リボフラビンリン酸エステルナトリウム…3mg
 ビリドキシン塩酸塩…………10mg
 ニコチン酸アミド…………20mg
 無水カフェイン…………50mg
 添加物：白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、
 クエン酸水和物、安息香酸Na、カラメル、マクロ
 ゴール、メタリン酸Na、エタノール、香料、バニリン、
 プロピレングリコール〔アルコール0.3mL以下〕
 ●本剤に配合されているリボフラビンリン
 酸エステルナトリウムにより、尿が黄色
 になることがある。

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)
 を服用する。
 ●用法・用量を厳守すること(他のビタ
 ミン等を含有する製品を同時に使
 用する場合には過剰摂取等にご注
 意すること)。
 ●本剤は、まれに沈殿を生じることが
 ある。よく振って服用すること。

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

TL05

100mL

滋養強壮、虚弱体質
 肉体疲労時の栄養補給に
 タウリン3000mg

ローヤルゼリー
 200mg

Nutritional
 Fortification
 For Frail Health

リキセー
 3000

指定医薬部外品

〔使用上の注意〕

相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を
 持って医師又は薬剤師に相談すること(1)
 本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発
 疹等の症状があらわれた場合。(2)しばら
 く服用しても症状がよくなる場合。

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・
 病中病後・食欲不振・栄養障害・
 発熱性消耗性疾患・産前産
 後などの場合の栄養補給。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼
 しい所に保管すること。(2)小
 児の手の届かない所に保管す
 ること。(3)他の容器に入れ
 替えないこと(誤用の原因
 になったり品質が変わる)。
 (4)使用期限を過ぎた製品は
 服用しないこと。(5)加温、冷
 凍はさけること。(6)長期間
 の低温保管等により、まれに
 結晶を生じることがある。

リキセー3000



ガラス：瓶 金属：キャップ

使用期限

製造番号