

販売名:イソビタンAⅡ

成分・分量 1日量1本(100mL)中
 チアミン硝酸物…10mg、リボフラビンリン酸
 エステルナトリウム…5mg、ビリドキシン塩酸
 塩…5mg、ニコチン酸アミド…20mg、無水
 カフェイン…50mg、ローヤルゼリー抽出液…
 50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、タウ
 リン…1000mg、イノシトール…50mg 添加
 物:白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、クエン酸
 水和物、安息香酸Na、クエン酸Na水和物、DL-
 リンゴ酸、カラメル、アルギン酸Na、エタノール、
 香料、グリセリン、バニリン、プロピレングリ
 コール(アルコール0.2mL以下)●本剤に
 配合されているリボフラビンリン酸エステル
 ナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を
 服用する。●用法・用量を厳守すること(他
 のビタミン等を含有する製品を同時に使用
 する場合には過剰摂取等に注意すること)。
 ●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。
 よく振って服用すること。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病
 後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性
 疾患・産前産後などの場合の栄養補給

発売元 **タムラ** 活性株式会社

大阪市中央区道修町2-1-10

製造販売元 **田村薬品工業株式会社**

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

KL05

肉体疲労時の栄養補給・滋養強壮

イソビタンAⅡ

ローヤルゼリー・タウリン配合



使用上の注意

【相談すること】1.服用後、次の症状があらわれた場合は
 副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製
 品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

●本剤の服用により、
 胃部不快感、下痢、発
 疹等の症状があらわ
 れた場合、2.しばらく
 服用しても症状がよ
 くならない場合は服
 用を中止し、この製
 品を持って医師、薬
 剤師又は登録販売者
 に相談すること

保管及び取扱い 上の注意

(1)直射日光の当た
 らない涼しい所に保
 管すること。(2)小児
 の手の届かない所に
 保管すること。(3)他
 の容器に入れ替えな
 いこと(誤用の原因に
 なったり品質が変わ
 る)。(4)使用期限を
 過ぎた製品は服用し
 ないこと。(5)加温、
 冷凍はさけること。

金属:キャップ
 ガラス:瓶

使用期限

製造番号



指定医薬部外品 100mL