

〈目薬〉 第3類医薬品

朝 光 水

目は身体の中で大切な部分で、精密でデリケートな器官です。毎日の生活の中で、現代人は、テレビ、排気ガス、車の運転、細菌や紫外線などさまざまな刺激に酷使されています。目を酷使すると目が疲れたり、目に炎症がおけると赤く充血したり、目のかすみなどの症状があらわれます。このような時、それらの症状を取り除いて、目を守るのに朝光水が効果をあらわします。

〔作用と特徴〕

- 一、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）は、目に栄養を与えて、疲れ目などの症状を改善します。
- 二、クロルフェニラミンマレイン酸塩の抗炎症作用により、目の炎症を鎮め、充血をとります。
- 三、硫酸亜鉛水和物の収れん作用により、目の炎症を鎮めます。
- 四、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは、傷つきやすい角膜を保護します。
- 五、さわやかなさし心地の目薬です。

⚠ 使用上の注意

【相談すること】

- 一、次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (一) 医師の治療を受けている人
 - 二 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (三) 次の症状のある人
 - はげしい目の痛み
 - (四) 次の診断を受けた人
 - 緑内障
- 二、使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 三、次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (一) 目のかすみが改善されない場合
- (二) 二週間位使用しても症状がよくなりえない場合

〔効能効果〕

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

〔用法用量〕

一回一〜三滴、一日三〜六回点眼してください。

●用法用量に関連する注意

- (一) 用法用量を厳守してください。
- (二) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (三) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (四) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。点眼用にはのみ使用してください。

〔成分分量〕（1mL中）

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	1.0mg
クロロフェニラミンマレイン酸塩	1.5mg
硫酸亜鉛水和物	1.5mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3.0mg
添加物としてホウ酸、ホウ砂、リメンツール、d-ボルネオール、ゲラニオール、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコールを含有します。	

〔保管及び取扱上の注意〕

- (一) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車中・暖房器具の近くなど40℃以上になる場所に放置しないでください。（高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。）
- (二) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (三) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (四) 他の人と共用しないでください。
- (五) 使用期限の経過した製品は使用しないでください。（使用期限の範囲内であっても、開封後はなるべく早くご使用ください。）
- (六) 保存の状態によつては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってご使用ください。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室
電話（〇七四八）八八三二八〇
（大代表）
受付時間 九時から十七時まで
（土、日、祝日を除く）

販売元

本舗 天洋堂

〒四〇九二五二四

山梨県南巨摩郡身延町三七〇五
電話（〇五五六）六二〇〇四八

発売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田一九

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝八七九

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）