

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

## ＜目薬＞

# 日 朝 水

目は身体の中で大切な部分で、精密でデリケートな器官です。毎日の生活の中で、現代人は、テレビ、排気ガス、車の運転、細菌や紫外線などさまざまな刺激に酷使されています。目を酷使すると目が疲れたり、目に炎症がおこると赤く充血したり、目のかすみなどの症状があらわれます。このようなとき、日朝水は目の疲れや目の充血をとりのぞき症状を改善します。

## 〔作用と特徴〕

- 一、塩酸ピリドキシン（ビタミンB<sub>6</sub>）は、目に栄養を与えて、疲れ目などの症状を改善します。
- 二、マレイン酸クロルフェニラミンの抗炎症作用により、目の炎症を鎮め、充血をとります。
- 三、硫酸亜鉛の収れん作用により、目の炎症を鎮めます。
- 四、コンドロイチン硫酸ナトリウムは、傷つきやすい角膜を保護します。
- 五、さわやかなさし心地の目薬です。

## ⚠ 使用上の注意

## 【相談する人】

### 一、次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (一) 医師の治療を受けている人
- (二) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (三) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (四) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
- (五) 次の診断を受けた人  
緑内障

### 二、次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

#### (一) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |

- (二) 目のかすみ改善されない場合
- (三) 二週間位使用しても症状がよくなる場合

## 【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

## 【用法用量】

一回一〜三滴、一日三〜六回点眼して下さい。

## ●用法用量に関連する注意

- (一) 用法用量を厳守して下さい。
- (二) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (三) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (四) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (五) 点眼用にはのみ使用して下さい。

## 【成分分量】（1mL中）

|                                                                      |       |     |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|
| 塩酸ピリドキシン                                                             | ..... | 1.0 | mg |
| マレイン酸クロロフェニラミン                                                       | ..... | 1.5 | mg |
| 硫酸亜鉛                                                                 | ..... | 1.5 | mg |
| コンドロイチン硫酸ナトリウム                                                       | ..... | 3.0 | mg |
| 添加物としてホウ酸、ホウ砂、イメンツール、d-ボルネオール、ゲラニオール、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコールを含有します。 |       |     |    |

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (一) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近くなど40℃以上になる場所に放置しないで下さい。  
（高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。）
- (二) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (三) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (四) 他の人と共用しないで下さい。
- (五) 使用期限の経過した製品は使用しないで下さい。（使用期限の範囲内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。）

## ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室  
電話（〇七四八）八八三一八〇  
（大代表）  
受付時間 九時から十七時まで  
（土、日、祝日を除く）

# 覚 林 房

販売元

発売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田一一九

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝八七九

〒四〇九一二二四  
山梨県南巨摩郡身延町身延三五五〇  
電話（〇五五六）六二一〇〇一四