

〈目薬〉

第3類医薬品

日 朝 水

目は身体の中で大切な部分で、精密でデリケートな器官です。毎日の生活の中で、現代人は、テレビ、排気ガス、車の運転、細菌や紫外線などさまざまな刺激に酷使されています。目を酷使すると目が疲れたり、目に炎症がおけると赤く充血したり、目のかすみなどの症状があらわれます。このようなとき、日朝水は目の疲れや目の充血をとりのぞき症状を改善します。

〔作用と特徴〕

- 一、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）は、目に栄養を与えて、疲れ目などの症状を改善します。
- 二、クロルフェニラミンマレイン酸塩の抗炎症作用により、目の炎症を鎮め、充血をとります。
- 三、硫酸亜鉛水和物の収れん作用により、目の炎症を鎮めます。
- 四、コンドロイチン硫酸ナトリウムは、傷つきやすい角膜を保護します。
- 五、さわやかなさし心地の目薬です。



使用上の注意

■【相談すること】

- 一、次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (一) 医師の治療を受けている人
 - (二) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (三) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (四) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (五) 次の診断を受けた人
緑内障
- 二、次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (一) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (二) 目のかすみが改善されない場合
- (三) 二週間位使用しても症状がよくなるらない場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

- 一回一〜三滴、一日三〜六回点眼して下さい。
- 用法用量に関連する注意
 - (一) 用法用量を厳守して下さい。
 - (二) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
 - (三) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
 - (四) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
 - (五) 点眼用にはのみ使用して下さい。

【成分分量】（1mL中）

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	1.0mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.5mg
硫酸亜鉛水和物	1.5mg
コンドロイチン硫酸ナトリウム	3.0mg
添加物としてホウ酸、ホウ砂、リメントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコールを含有します。	

【保管及び取扱い上の注意】

- (一) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近くなど40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
 - (二) 高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。
 - (三) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (四) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
 - (五) 他の人と共用しないで下さい。
- 使用期限の経過した製品は使用しないで下さい。（使用期限の範囲内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。）

販売元

発売元

覚 林 房

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田一八九

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝八七九

〒四〇九一二二四
山梨県南巨摩郡身延町身延三五一〇
電話（〇五五六）六二一〇〇一四
FAX（〇五五六）六二一〇〇四五

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）