

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

〈目薬〉 第3類医薬品

日 朝 水

目は身体の中で大切な部分で、精密でデリケートな器官です。毎日の生活の中で、現代人は、テレビ、排気ガス、車の運転、細菌や紫外線などさまざまな刺激に酷使されています。目を酷使すると目が疲れたり、目に炎症がおけると赤く充血したり、目のかすみなどの症状があらわれます。このようなとき、日朝水は目の疲れや目の充血をとりのぞき症状を改善します。

〔作用と特徴〕

- 一、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）は、目に栄養を与えて、疲れ目などの症状を改善します。
- 二、クロルフェニラミンマレイン酸塩の抗炎症作用により、目の炎症を鎮め、充血をとります。
- 三、硫酸亜鉛水和物の収れん作用により、目の炎症を鎮めます。
- 四、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは、傷つきやすい角膜を保護します。
- 五、さわやかなさし心地の目薬です。

⚠ 使用上の注意

【相談すること】

- 一、次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (一) 医師の治療を受けている人
 - (二) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (三) 次の症状のある人はげしい目の痛み
 - (四) 次の診断を受けた人
- 二、使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 三、次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (一) 目のかすみ改善されない場合
- (二) 二週間位使用しても症状がよくならない場合

〔効能効果〕

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

〔用法用量〕

一回一〜三滴、一日三〜六回点眼して下さい。

●用法用量に関連する注意

- (一) 用法用量を厳守して下さい。
- (二) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (三) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (四) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (五) 点眼用のにのみ使用して下さい。

〔成分分量〕（1mL中）

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）……………一・〇mg
 クロロフェニラミンマレイン酸塩……………一・五mg
 硫酸亜鉛水和物……………一・五mg
 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………三・〇mg
 添加物としてホウ酸、ホウ砂、リメメントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコールを含有します。

〔保管及び取扱上の注意〕

- (一) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近くなど40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
- (二) 高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。
- (三) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (四) 他の容器に入れ替えないで下さい。
- (五) 使用期限の経過した製品は使用しないで下さい。（使用期限の範囲内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。）

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室
 電話（〇七四八）八八三一八〇
 （大代表）
 受付時間 九時から十七時まで
 （土、日、祝日を除く）

覚 林 房

販売元

発売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田一一九

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝八七九

〒四〇九一二二四

山梨県南巨摩郡身延町身延三五一〇

電話（〇五五六）六二一〇一四

FAX（〇五五六）六二一〇四四

<http://www.fujikawa.or.jp/~higuchi/kakurinbo/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 （独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）