

第2類医薬品

しっしん・かぶれ・虫さされ・かゆみに
新オイラックスH[®]クリーム
鎮痒消炎薬

新オイラックスHクリームの特徴

しっしん・かぶれは、日常広く見られる皮膚病ですが、皮膚が赤くなり強いかゆみを伴います。
そのかゆみのために、つい掻きむしって症状を悪化させることがあります。

1. クロタミトンの作用でかゆみをしずめますので、かくことによる症状の悪化を防ぎます。
2. ヒドロコルチゾン酢酸エステル作用により、しっしん・かぶれ・虫さされ等の皮膚の炎症にすぐれた効果を発揮します。
3. イソプロピルメチルフェノールは、殺菌作用を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

しっしん、かぶれ、虫さされ、かゆみ、じんましん、あせも、ただれ、皮膚炎、しもやけ

使用法

1日1～3回、適量を患部に塗布してください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

本剤は、白色のクリームで、1g中に次の成分を含有する。

成 分	含有量	働 き
クロタミトン	100mg	かゆみをおさえます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	2.5mg	皮膚の炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	殺菌作用を発揮します。

添加物：ステアリン酸マクロゴール、ステアリルアルコール、ワセリン、香料、グリセリン


塗布後ほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

<ヒドロコルチゾン酢酸エステルについて>

この成分は、副腎皮質ホルモン(ステロイド)の中で最も作用が緩和なランクに分類されております。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03(6667)3232

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標