

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

かゆみを伴う乾燥肌治療薬

## カユピタック<sup>®</sup>ローション 20 KAYUPITAC LOTION 20

第2類医薬品

### 特長

保湿成分の尿素 20%に、かゆみ止め成分リドカイン（局所麻酔剤）・ジフェンヒドラミン（抗ヒスタミン剤）および血行を良くして皮膚の新陳代謝を高めるトコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）を配合したローション剤で、かゆみを伴う乾燥性皮膚治療薬です。

- 尿素のはたらきで、カサカサ肌にうるおいを与え、しっとりなめらかな状態を保ちます。
- リドカイン、ジフェンヒドラミンがかゆみを止め、グリチルレチン酸が炎症をおさえます。
- 乳液状で広範囲に塗りやすく、液だれしません。
- 微香性なので、においが気になりません。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

#### 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目の周囲、粘膜等
  - (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひび割れ）部位
  - (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ
  - (4) 炎症部位（ただれ・赤くはれているところ）

#### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくなる場合場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【効能・効果】

かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症）

【用法・用量】 1日1～数回、適量を患部に塗布する。

**用法・用量に関連する注意**

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児（15歳未満）には使用させないでください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

【成分・分量】

1g中

成分	含量	はたらき
尿素	200mg	保湿成分。カサカサ肌に水分をとりこみ、しっとりやわらかくします。
リドカイン	20mg	かゆみの刺激が伝わるのをブロックすることで、かゆみをおさえます。
ジフェンヒドラミン	10mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみをおさえます。
グリチルレチン酸	3mg	皮ふの炎症をおさえます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を良くして皮ふの新陳代謝を高めます。

添加物としてミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、1-メントール、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、ゲラニオール変性アルコール（99vol%）、水酸化ナトリウム、スクワラン、白色ワセリン、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (5) 使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

【包装】

100g

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の当社「お客様相談窓口」までお願い申し上げます。

祐徳薬品工業株式会社 お客様相談窓口  
電話：0954-63-1320  
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
 0120-149-931

製造販売元  祐徳薬品工業株式会社

日本製 佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1