

この添付文書は、本剤とともに大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

医薬品

ろくみがん
トチモトの六味丸

「六味丸」は、漢方の古書「小児方訣」に収載されている漢方処方「六味地黄丸」を基本に6種の生薬末を合わせ、ハチミツを加え丸剤としたものです。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

下痢

【成分・分量】

本品1日量(60丸、6,000mg) 中

ジオウ末	1,200mg
サンシュユ末	600mg
サンヤク末	600mg
日本薬局方 タクシャ末	450mg
日本薬局方 ブクリョウ末	450mg
日本薬局方 ボタンビ末	450mg
日本薬局方 コメデンブン	450mg
日本薬局方 ハチミツ	1,800mg

【効能・効果】

疲れやすくて尿量減少または多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ

【用法・用量】

15歳以上 1回20丸、1日3回、食前又は食間に服用

食間とは・・・食後2~3時間を指します

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 15歳未満の小児には、服用させないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤はハチミツを入れて製丸していますので、容器中で丸剤どうしがくっつくことがあります、薬効には変わりがありませんので、軽く振ってご使用ください。
- (5) 本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります、効果には変わりありません。
- (6) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意下さい。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃木天海堂

TEL 06-6312-8425

受付時間：10時～17時

(土、日、祝日を除く)

TOCHIMOTO
株式会社 栃木天海堂
大阪市北区末広町3番21号